



ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม ปี 2563

ข่าวเดือนการระบาดของศัตรูพืช

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โทร 032-488057

โรคใบจุดในไม้ดอก

โรคใบจุดในดาวเรือง

อาการของโรค

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา *Alternaria sp.*

ใบเริ่มมีอาการเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ ส่วนใหญ่เริ่มจากใบล่างๆก่อน แผลจะขยายใหญ่หรือจุดน้ำตาลขยายมารวมกัน มักจะเห็นตรงกลางแผลสีขาว หากใช้แว่นขยายจะเห็นสปอร์ของเชื้อรา โรคนี้จะรุนแรงมากขึ้นหากมีการทำลายของหนอนชอนใบร่วมด้วย อาการที่รุนแรงใบจะแห้ง และลุกลามไปทำลายที่ดอกด้วย

โรคใบจุดในกล้วยไม้

อาการของโรค

เชื้อสาเหตุเชื้อรา *Phyllostictina pyriformis*

เกิดได้ตลอดปีลักษณะอาการจะแตกต่างกันไป เช่น แวนดำ แผลจะมีลักษณะเป็นรูปยาวรีคล้ายกระสวยตรงกลางแผลจะมีตุ่มนูนสีน้ำตาล เกษตรกรมักเรียกว่าโรคช้ำกลาก ในสกุลหวายแผลจะมีจุดกลมสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ขอบแผลมีสีน้ำตาลอ่อนเกิดได้ทั้งใบบนและใบล่าง



อาการใบจุดดาวเรือง



อาการใบจุดกล้วยไม้

การป้องกันกำจัด

1. ตรวจสอบแปลงปลูกอยู่เสมอหากพบโรคให้นำส่วนที่เป็นโรคเผาทำลาย
2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อสด) อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นหรือรดแปลง ทุก 15 วัน
3. ถ้าระบาดมาก พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
 - คลอโรธาโลนิล อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 - ไซเนบ อัตรา 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 - คาร์เบนดาซิม อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

เนื้อหา:อำไพ สุขจำรูญ /รูปแบบ: จันทิมา เอี่ยมสะอาด