



ข่าวเดือนการระบาดของศัตรูพืช

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โทร 032-488057

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

เดือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศเวียดนามและกัมพูชาที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง มีความเสี่ยงสูงที่จะมาถึงประเทศไทย ซึ่ง **โรคสามารถติดมากับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งอื่น**



แมลงหิวขาวยาสูบ

เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส (**ไม่มียารักษา**)

ลักษณะอาการ ต้นมันสำปะหลังจะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่ แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน และมันไม่สร้างหัว

การแพร่ระบาด แพร่กระจายผ่านทางท่อนพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ และมีแมลงหิวขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะนำโรคมาสู่ ลำต้นมันสำปะหลัง

การป้องกันกำจัด

1. **ห้าม** นำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลัง ยกเว้นมันเส้น และหัวมันสดจากประเทศที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
2. ตรวจสอบแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
3. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค
4. หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่าง ให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอโดยทันที
5. ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อโรคจากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตกค้างอยู่ในแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด
6. กำจัดหรือหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สนุ่นดำ ละหุ่ง เป็นต้น
7. กำจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหิวขาวยาสูบ