



# ข่าวเดือนการระบาดของศัตรูพืช

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โทร 032-488057

## ช่วงนี้สภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง เดือนเกษตรกรเฝ้าระวัง การระบาดของ หนอนเจาะฝักถั่วลายจุด

เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชตระกูลถั่ว ทำลายดอกและฝักถั่วฝักยาว เมื่อหนอนฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินภายในดอกอ่อนเกสร ทำให้ดอกร่วง เมื่อหนอนโตขึ้นจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในฝัก ส่วนที่เป็นเมล็ดอ่อน ทำให้ฝักและเมล็ดลีบผลผลิตลดลง



### การป้องกันกำจัด

1. ก่อนปลูกพืช ควรไถพรวนดิน ตากแดด 2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดดักแด้ของศัตรูพืชที่อยู่ในดิน
2. สำรวจแปลงเมื่อพบมูลหนอนที่ถ่ายออกมาจากฝักถั่วให้เด็ดฝักทิ้งทำลายนอกแปลง
3. การใช้เชื้อแบคทีเรีย (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) อัตรา 60-80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น
4. การใช้สารฆ่าแมลง เช่น เบต้าไซฟลูทริน (โฟลิเทค 025 อีซี 2.5% อีซี) อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หรือเดลทาเมทริน (เดซิส 33% อีซี) อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร